



Fontos figyelmeztetések a NanoTac EC használatához:

- A NanoTac EC-t NE használjuk fiatal növényeken (palánta) a zsege levelek érzékenysége miatt fellépő perzselési veszély elkerülése érdekében!
- Két kezelés között minden esetben hagyjunk ki 7-10 napot, a 3-4. kezelés előtt pedig legalább 14 nap szünetet kell tartani!
- A NanoTac EC-t NE keverjük nedvesítő szerekkel, adjuvánsokkal!
- Nem alkalmazható a termék esős időben, illetve ha 10 órán belül eső vagy szitálás várható.
- Kiemelten fontos, hogy a termék gyorsan felszáradjon, ezért ez esti, illetve éjszakai kijuttatás kerülendő!

Túladagolni tilos!

Ajánlott dózisok:

Gyümölcs és bogyós gyümölcsök: 0,13%-0,15%
(120-150 ml /100 l) (500-800 l/ha vízmennyiséggel)

Zöldségfélék: 0,1%-0,15%

Uborka: 0,1%


Paradicsom, kaliforniai paprika, padlizsán: 0,05%-0,07%

Díszfák és cserjék: 0,1%-0,15%

Rózsa: 0,1%

Egyéb dísznövények: 0,05% (500-1000 l/ha vízmennyiséggel)

Bizonyos kultúrákban (alma, körte, dísznövények) virágzás időszakában nem alkalmazható a termék a sziromsérülések kockázata miatt.



MMM
MALAGROW

MALAGROW Kft.

Szolnok, Újszászi út 38.

Telefon: +36 56 514-160

www.malagrow.hu